




Cuprocyparis leylandii



Height	5 - 6 m
Crown	columnar to narrow pyramidal, dense crown
Bark and branches	twigs light reddish brown, bark reddish brown, slightly flaking
Leaf	pointed scales, dull medium green, evergreen
Flowers	round, reddish-brown cones, 2 cm
Fruits	C.J. Leyland, Leighton Park, Welshpool, Wales, 1888
Spines/thorns	None
Toxicity	usually not toxic to people, (large) pets and livestock
Soil type	any well-drained, sufficiently moist soil
Paving	tolerates no paving
Winter hardiness zone	7a (-17,7 to -15,0 °C)
Wind resistance	good
Other resistances	can withstand wind
Application	cemeteries, coastal areas, industrial areas, large gardens, windbreaks
Shape	clearstem tree, specimen conifer, hedge plant
Origin	Grote zuilvormige tot smal piramidale conifeer met een dichte vertakking, die gemakkelijk kan uitgroeien tot een boom van 15 tot 30 m hoogte. De bast is roodbruin en laat op latere leeftijd los in lange, vezelachtige platen. De jonge twijgen zijn eerst groengeel, later licht roodbruin. Het loof is dof middengroen. De boom groeit op alle gronden, mits goed doorlatend en voldoende vochtig, en verdraagt ook veel wind. Ze behoort, naast verschillende cultivars van Chamaecyparis lawsoniana en Thuja, tot de meest populaire haagplanten. De van nature smalle habitus is een voordeel bij het gebruik als haag en daarbij is de boom zeer goed te snoeien. Vanwege de krachtige groei moet er twee keer per jaar worden gesnoeid en dan ontstaat een zeer dichte haag. De boom ontstond in 1888 uit een kruising tussen Chamaecyparis nootkatensis en Cupressus macrocarpa. Nieuwe inzichten leidden ertoe dat C. nootkatensis in een ander geslacht werd ingedeeld (Xanthocyparis). Dit had tot gevolg dat de hybridesoo
Synonyms	× Cupressocyparis leylandii