




Pinus nigra subsp. laricio



Hoogte	50 m
Kroon	in jeugd breed kegelvormig, later rond, dichte kroon
Schors en takken	twijgen oranjebruin, bast grijs, diep gegroefd en met onregelmatig gevormde platen
Blad	flexibele naalden, 2 bijeen, 8 - 15 cm, groen, groenblijvend
Bloemen	in bundels bij de jonge scheuten, geel, geurende bloemen
Vruchten	afstaand hangende kegels, alleenstaand of in paren, 5 - 10 cm lang, 2 - 4 cm breed
Stekels/doorns	Geen
Giftigheid	gewoonlijk niet giftig voor mensen, (grote) huisdieren en vee
Grondsoort	alle
Bodemvochtigheid	kan op droge grond
Verharding	verdraagt geen verharding
Winterhardheid	5b (-26,0 tot -23,4 °C)
Windbestendigheid	zeer goed
Overige bestendigheden	bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6), bestand tegen wind
Faunaboorn	bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6), bestand tegen wind, voedselboom voor vogels
Toepassing	parken, speelpleinen, boombakken, begraafplaatsen, daktuinen, kustgebieden, industriegebied, grote tuinen
Vorm	hoogstam boom, hoogstam conifeer, solitaire conifeer
Oorsprong	Corsica, Italië

Deze Pinus verschilt slechts in detail van *P. nigra* subsp. *nigra* en vormt eveneens een zeer grote, imposante boom met een opvallende schors. Als jonge boom nog piramidaal groeiend maar op latere leeftijd breder en met een ronde tot bijna schermvormige kroon. De bast is lichter grijs dan bij *P. nigra* subsp. *nigra* en heeft grotere bastplaten. Ze is diep gegroefd en vooral bij oudere bomen zeer decoratief. De twijgen zijn oranjebruin. De naalden zijn lichter groen en duidelijk minder stijf dan bij *P. nigra* subsp. *nigra*. De lichtbruine, afstaand hangende kegels hangen in paren van twee of alleen. De boom is geschikt voor vele grondsoorten en groeit ook op droge kalkrijke grond. Bestand tegen zeewind en ongevoelig voor luchtvervuiling.