



Taxodium distichum 'Nutans'



Hoogte	18 - 30 (50) m
Kroon	smal piramidaal, later breder, halfopen kroon
Schors en takken	roodbruine, vezelige, gegroefde schors, jonge twijgen groen
Blad	naalden zachtgroen, spiraalvormig tegen de twijg, 0,5 - 1 cm lang
Herfstkleur	oranje, rood
Bloemen	onopvallend
Vruchten	eironde kegels, Ø 2 - 3 cm, eerst groen, later bruin
Stekels/doorns	Geen
Giftigheid	gewoonlijk niet giftig voor mensen, (grote) huisdieren en vee
Grondsoort	vochthoudend tot moerasachtig, kan ook matig droog
Bodemvochtigheid	kan op natte grond
Verharding	verdraagt halfverharding
Winterhardheid	6a (-23,3 tot -20,6 °C)
Windbestendigheid	zeer goed
Overige bestendigheden	bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6), bestand tegen wind
Toepassing	parken, begraafplaatsen, industriegebied, grote tuinen
Vorm	hoogstam boom, beveerde boom, hoogstam conifeer, solitaire conifeer
Oorsprong	zuidoosten van Noord-Amerika
Synoniemen	Taxodium ascendens 'Nutans'

Bladverliezende conifeer die iets langzamer groeit dan de soort. Oudere bomen vormen in of nabij water bovengrondse kniewortels. Deze kunnen tot circa 1 m hoog en 30 cm breed worden. De vezelige stam is zeer knoestig en onderaan zeer breed wordend. Hij tordeert spiraalsgewijs tegen de klok in. De takstand en de jonge twijgen zijn iets meer opgaand dan bij de soort. Jonge scheuten en kortloten zijn groen. Deze kortloten zijn 5 - 10 cm lang, met niet verspreid staande naalden. Kortloten en naalden vallen in de herfst gelijktijdig af. Verschil met de soort is dat de naalden bij 'Nutans' meer opgericht en tegen de twijg aangedrukt staan. De herfstkleur is oranjebruin tot roodbruin. Na de bloei volgen eironde groene kegels die bij rijping bruin worden. Verdraagt langdurig onder water staan. Taxodium distichum 'Nutans' valt in het voorjaar op door de helder lichtgroen uitlopende naalden. In de herfst verkleuren deze warm oranje- tot roodbruin.