



Acer campestre



Hoogte	circa 12 m
Kroon	ovaal, dichte kroon, grillig groeiend
Schors en takken	grijze schors met opvallende kurklijsten
Blad	3/5-lobbig, donkergroen, 6 - 10 (12) cm
Herfstkleur	geel
Bloemen	kleine, eindstandige tuilen, geelgroen, mei
Vruchten	eenzadig, gevleugeld, steeds 2 bijeen
Stekels/doorns	Geen
Giftigheid	gewoonlijk niet giftig voor mensen, (grote) huisdieren en vee
Grondsoort	alle, behalve droge arme zandgrond
Bodemvochtigheid	bestand tegen korte overstroming
Verharding	verdraagt halfverharding
Winterhardheid	5a (-28,8 tot -26,1 °C)
Windbestendigheid	zeer goed
Overige bestendigheden	bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6), bestand tegen wind, bestand tegen strooizout
Faunaboom	bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6), bestand tegen wind, bestand tegen strooizout, waardboom voor vlinders
Toepassing	lanen en brede straten, parken, speelpleinen, boombakken, begraafplaatsen, daktuinen, kustgebieden, industriegebied, grote tuinen, boomsingel
Vorm	hoogstam boom, beverde boom, meerstammige boom
Oorsprong	Europa, westelijk Azië en Noord-Afrika

Middelgrote boom tot circa 12 m hoog. Door de onregelmatige vertakking wordt geen symmetrische kroon gevormd. De takken bezitten opvallende kurklijsten, zowel op oud als jong hout. Het jonge loof is bij uitlopen soms iets roodachtig, maar wordt spoedig donkergroen. De herfstkleur is donkergeel en kan lang aanblijven. A. campestre is in Nederland inheems en wordt al zeer lang door de mens gebruikt. Niet alleen als boom, maar ook gesnoeid als haag is deze plant zeer functioneel. Mede dankzij het feit dat A. campestre schaduw verdraagt en in industriegebieden kan groeien is het een veelzijdige plant. Vormt een sterk vertakkende hoofdwortel met zeer veel haarwortels. Omdat deze plant door zaaïen wordt vermeerderd kan er in de nakomelingen enige variatie optreden. Dit uit zich doordat sommige kenmerken (herfstkleur, kurklijsten op de takken) in meer of mindere mate aanwezig zijn. Acer campestre wordt ook vaak als haagplant toegepast omdat snoei buitengewoon goed wordt verdragen. Vanwege de vroege sapstroom mag snoei echter nooit in het voorjaar plaatsvinden.