




## Acer davidii 'George Forrest'



|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hoogte</b>                 | 6-8 m                                                                         |
| <b>Kroon</b>                  | breed vaasvormig, open kroon, grillig groeiend                                |
| <b>Schors en takken</b>       | twijgen purper met grijswitte lengtestrepen                                   |
| <b>Blad</b>                   | groen, uitloop purper                                                         |
| <b>Bloemen</b>                | lichtgeel, bloeit in mei                                                      |
| <b>Vruchten</b>               | roze, groen                                                                   |
| <b>Stekels/doorns</b>         | Geen                                                                          |
| <b>Giftigheid</b>             | gewoonlijk niet giftig voor mensen, (grote) huisdieren en vee                 |
| <b>Grondsoort</b>             | kleigrond, lemige grond, zandgrond, veengrond                                 |
| <b>Verharding</b>             | verdraagt geen verharding                                                     |
| <b>Winterhardheid</b>         | 5 (-28,8 tot -23,4 °C)                                                        |
| <b>Windbestendigheid</b>      | goed                                                                          |
| <b>Overige bestendigheden</b> | bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6), bestand tegen wind                          |
| <b>Faunaboom</b>              | bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6), bestand tegen wind, waardboom voor vlinders |
| <b>Toepassing</b>             | parken, boombakken, begraafplaatsen, daktuinen, grote tuinen                  |
| <b>Vorm</b>                   | hoogstam boom, meerstammige boom                                              |

De zaden waaruit deze boom ontstond werden door de planthunter George Forrest in China verzameld. De originele boom week dermate af van andere A. davidii klonen dat men besloot deze naar Forrest te noemen. De belangrijkste kenmerken zijn een open, breed waaivormige habitus met hangende twijgen. De jonge scheuten zijn purper terwijl de oudere bast groen is en lichtgrijze strepen heeft. Om een cultivar soortecht te houden moet deze vegetatief worden vermeerderd. Helaas is 'George Forrest' in het verleden ook gezaaid en werden de nakomelingen ten onrechte ook 'George Forrest' genoemd.