



Acer tataricum subsp. ginnala



Hoogte	5 - 7 (10) m, snelgroeiend
Kroon	waaivormig, halfopen kroon
Schors en takken	stam grijs, iets gegroefd, jonge twijgen roodbruin
Blad	3-lobbig, heldergroen, 4 - 8 cm
Herfstkleur	oranje, rood
Bloemen	crèmewit, eindstandige trossen, mei/juni
Vruchten	gevleugeld, bijna parallel lopend, circa 2,5 cm lang
Stekels/doorns	Geen
Giftigheid	gewoonlijk niet giftig voor mensen, (grote) huisdieren en vee
Grondsoort	alle
Bodemvochtigheid	kan op droge grond
Verharding	verdraagt halfverharding
Winterhardheid	3 (-40,0 tot -24,5 °C)
Windbestendigheid	goed
Overige bestendigheden	bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6), bestand tegen wind, bestand tegen strooizout
Faunaboom	bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6), bestand tegen wind, bestand tegen strooizout, drachtboom voor bijen
Toepassing	parken, boombakken, begraafplaatsen, industriegebied, grote tuinen
Vorm	hoogstam boom, meerstammige boom
Oorsprong	Midden- en Noord-China, Japan, Mantsjoerije
Synoniemen	Acer ginnala

Deze struik groeit meestal uit tot een kleine, meerstammige boom. Door de spreidende takstand ontstaat uiteindelijk een mooie solitair. Ondanks de vrij trage groei kan deze esdoorn in volle ouderdom toch een hoogte en breedte van ruim 10 m bereiken. In de natuurlijke groeigebieden in Azië en Rusland komen zelfs nog grotere exemplaren voor. Jonge en slanke twijgen die voldoende zonlicht krijgen, kleuren roodbruin. Oudere takken hebben een grijze kleur. Bij het drielobbige blad is de middenlob smal en lang. Belangrijke sierwaarde is de herfstverkleuring van het glanzend donkergroene blad in vele tinten rood tot oranje. Op een zonnige standplaats vaak beter uitkomend. De fijne wortelgroei is plat oppervlakkig. Een zeer winterharde plant die goed bestand is tegen luchtvervuiling, droogte en strooizout.